Аптечка первой помощи (Рюкзак)

Укус змеи:
Визг. 5-10 минут хромота. Вялая. Может умереть в течении 2-3 дней.
1. В ляжку. Супрастин 2мл. Против Аллергии.
2. В ляжку. Преднизалон 2мл. Против Отеков.
3. В ляжку. Анальгин 50% 2мл + дибазол 1% 2мл. Обезболивающие.
4. В ляжку. Сульфокамфокаин 2мл. Сердечное. Не обязательно для молодых.
5. В холку. Раствор Рингера 40мл (5% раствор глюкозы или 0,9% раствор натрия хлорида) + 2 мл аскорбиновой кислоты.
П 1-4 повторить через 12 часов. П. 5 три раза, интервал 2 часа.
На вторые сутки нормальное состояние. Отек может держаться долго. На месте укуса может быть большой нарыв (опасно для жизни. К ветеринару).

Укус насекомых (пчелы, осы):
Визг. Аллергическая реакция.
1. Удалить жало (пчела)
2. В ляжку. Супрастин 2мл. Против Аллергии.
3. В ляжку. Преднизалон 2мл. Против Отеков.
4. В ляжку. Сульфокамфокаин 2мл. Сердечное. Не обязательно для молодых.
На месте укуса может быть большой нарыв (опасно для жизни. К ветеринару).

Отравление изониазидом
Симптомы: Сонливость, спутанность сознания - появляются через 30 мин, потеря координации, подкашиваются ноги, заносит по сторонам, рвота, обильное слюноотделение, пена изо рта, при тяжелом отравлении возможны кома, угнетение дыхания, судороги, лактацидоз. Судороги длительные и не купируются.
1. Вызвать рвоту. 1:1 Перекись с водой. 1ст. ложка на 3 кг. Животного.
2. Пиридоксин (В6) – 1мл. на 5 кг.
3. Энтеросгель, активированный уголь (1таблетка на 1 кг.)

Отравление крысином ядом
Симптомы: Кровавая рвота, кровавый понос, кровь отовсюду нарушена свертываемость, вялость, отсутствие аппетита, анемичность слизистых, одышка, стон. Симптомы через время (до 5 дней), пока расходуются запасы К1.
1. Энтеросгель, активированный уголь (1таблетка на 1 кг.)
2. К1 (Викасол) – 2мл.

Состав:

Шприц 3мл – 2 шт.
Супрастин 1мл – 2 шт.
Преднизалон 1мл – 2 шт.
Анальгин 2мл – 1 шт.
Дипазол 1мл – 2 шт.
Сульфокамфокаин 2 мл – 1шт.
Перекись водорода 5мл – 2шт.
Стептоцид 2г – 3шт.

Бинт 7см -1шт.
Бинт 10см – 1шт.
Бинт самофиксирующийся 2,5см – 1шт.
Жгут – 1шт.
Пластырь полоски – 3шт.
Пиридоксин (В6) – 4мл.
К1 (Викасол) – 4мл.