- Укус змем:
 Визг. 5-10 минут хромота. Вялая. Может умереть в течении 2-3 дней.

 1. В ляжу. Супрастин 2мл. Против Аллергии.

 2. В ляжу. Преднизалот 2мл. Против Сисков.

 3. В ляжу. Преднизалот 2мл. Против Сисков.

 3. В ляжу. Ачальгин 50% 2мл + дибазол 1% 2мл. Обезболивающие.

 4. В ляжу. Сульфокамфокаин 2мл. Сердечное. Не обязательно для молодых.

 5. В холку. Раствор Рингера 40мл (5% раствор глюкозы или 0,9% раствор натрия хлорида) + 2 мл аскорбиновой вислоты.

 11-4 повторить через 12 часов. П. 5 три раза, интервал 2 часа.

 На вторые сутки нормальное состояние. Отек может держаться долго. На месте укуса может быть большой нарыв (опасно для жизни. К ветеринару).

- Укус насекомых (пчелы, осы);
 Визг. Аллергическая реакция.
 1. Удалить жало (пчела)
 2. В ляжку. Супрастин 2мл. Против Аллергии.
 3. В ляжку. Греднизалон 2мл. Против Отеков.
 4. В ляжку. Супъфокамфоками 2мл. Сердечное. Не обязательно для молодых.
 На месте укуса может быть большой нарыв (опасно для жизни. К ветеринару).

Отравление изониазидом
Симптомы: Сонливость, спутанность сознания - появляются через 30 мин, потеря координации, подкашиваются ноги, заносит по сторонам, рвога, обильное слноноотделение, пена изо ртя, при тяжелом отравлении возможны кома, угнетение дыхания, судороги, лактацидоз. Судороги длительные и не

- купируются.

 1. Вызвать рвоту. 1:1 Перекись с водой. 1ст. ложка на 3 кг. Животного.
- 2. Пиридоксин (В6) 1мл. на 5 кг. 3. Энтеросгель, активированный уголь (1таблетка на 1 кг.)

<u>Отравление крысином ядом</u> Симптомы: Кровавая рвота, кровавый понос, кровь отовсюду нарушена свертываемость, вялость, отсутствие аппетита, анемичность слизистых, одышка, стон. Симптомы через время (до 5 дней), пока расходуются запасы

- 1. Энтеросгель, активированный уголь (1таблетка на 1 кг.) 2. К1 (Викасол) 2мл.

Распечатать. Вырезать. Согнуть пополам. Проклеить с двух сторон скотчем. Вложить в аптечку.

Получается небольшая двухсторонняя карточка:

